

UFA Prairie fleurie sèche CH-G

Densité de semis: 10 g/m²

Graminées

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| <i>Anthoxanthum odoratum</i> | Flouve odorante |
| <i>Briza media</i> | Brize intermédiaire |
| <i>Bromus erectus</i> | Brome dressé |
| <i>Cynosurus cristatus</i> | Crételle des prés |
| <i>Festuca guestfalica</i> | Fétuque de Westphalie |
| <i>Festuca pratensis</i> | Fétuque des prés |
| <i>Festuca rubra rubra</i> | Fétuque rouge |
| <i>Helictotrichon pubescens</i> | Avoine pubescente |
| <i>Koeleria pyramidata</i> | Koelérie pyramidale |
| <i>Melica ciliata</i> | Mélique ciliée |
| <i>Poa compressa</i> | Pâturin comprimé |

Fleurs

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| <i>Achillea millefolium</i> | Achillée millefeuille |
| <i>Acinos arvensis</i> | Sarriette acinos |
| <i>Anthericum ramosum</i> | Anthéric rameux |
| <i>Anthyllis carpatica</i> | Anthyllide commune |
| <i>Arabis hirsuta</i> | Arabette hérissée |
| <i>Asperula cynanchica</i> | Aspérule des collines |
| <i>Bupthalmum salicifolium</i> | Buptharme à feuilles de saule |
| <i>Campanula glomerata</i> | Campanule agglomérée |
| <i>Campanula rapunculus</i> | Campanule des haies |
| <i>Campanula rotundifolia</i> | Campanule à feuilles rondes |
| <i>Centaurea jacea</i> | Centaurée jacée |
| <i>Centaurea scabiosa</i> | Centaurée scabieuse |
| <i>Crepis biennis</i> | Crépide bisannuelle |
| <i>Daucus carota</i> | Carotte sauvage |
| <i>Dianthus carthusianorum</i> | Œillet des Chartreux |
| <i>Erigeron acris</i> | Vergerette âcre |
| <i>Euphorbia cyparissias</i> | Euphorbe petit cyprès |
| <i>Galium verum</i> | Gaillet jaune |
| <i>Geranium sanguineum</i> | Géranium sanguin |
| <i>Globularia bisnagarica</i> | Globulaire allongée |
| <i>Helianthemum nummularium</i> | Hélianthème nummulaire |
| <i>Hieracium pilosella</i> | Epervière piloselle |
| <i>Hieracium piloselloides</i> | Epervière florentine |
| <i>Hippocrepis comosa</i> | Hippocrépide commune |
| <i>Knautia arvensis</i> | Knautie des champs |
| <i>Leontodon hispidus</i> | Liondent hispide |
| <i>Leucanthemum vulgare</i> | Marguerite |
| <i>Lotus corniculatus</i> | Lotier corniculé |
| <i>Onobrychis viciifolia</i> | Esparcette commune |
| <i>Origanum vulgare</i> | Origan |
| <i>Picris hieracioides</i> | Picride amère |
| <i>Pimpinella saxifraga</i> | Boucage saxifrage |
| <i>Plantago media</i> | Plantain moyen |

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Potentilla verna | Potentille du printemps |
| Primula veris | Primevère officinale |
| Prunella grandiflora | Brunelle à grandes fleurs |
| Ranunculus bulbosus | Renoncule bulbeuse |
| Salvia pratensis | Sauge des prés |
| Sanguisorba minor | Petite pimprenelle |
| Scabiosa columbaria | Scabieuse colombarie |
| Silene nutans | Silène penché |
| Silene vulgaris | Silène enflé |
| Stachys recta | Epiaire droite |
| Teucrium chamaedrys | Germandrée commune |
| Thymus carniolicus | Thym de Carniole |
| Thymus pulegioides | Thym pouliot |
| Tragopogon orientalis | Salsifis d'orient |
| Trifolium montanum | Trèfle des montagnes |
| Veronica teucrium | Véronique germandrée |